

Гастродуоденал Ярали Қон Кетиши Хирургиясида Замонавий Ёндашувлар

Рахмонов Фирдавс Саломатович¹, Шоназаров Искандар Шоназарович²

Резюме: Мақолада ярали этиологиянинг ўткир гастродуоденал қон кетишини (ГДКК) даволаш муаммосининг ҳозирги ҳолати таҳлил қилинади. Яра касаллиги (ЯК) билан касалланишнинг йиллик даражаси 0,17% га етади. ЯК нинг энг кенг тарқалган асоратлари ГДКК бўлиб, унинг частотаси, турли муаллифларнинг фикрига кўра, 100000 аҳолига 20 дан 100 дан ортиқ ҳолатларни ташкил қиласди. Ярали қон кетишини (ЯҚҚ) ташхислаш ва даволашнинг энг муҳим усули бу эзофагодуоденоскопия. Гастродуоденал ЯҚҚ нинг такрорланиш даражаси турлича ва Форрест таснифига кўра таснифланади. Эндоскопик гемостаз ёки антисекретор дорилар билан жарроҳлик даволаш комбинацияси қўлланилганда ГДКК даволаш самарадорлиги сезиларли даражада ошади.

Калит сўзлар: Яра касаллиги, гастродуоденал қон кетиши, гемостаз.

Ошқозон ва ўн икки бармоқли ичакнинг яра касаллиги -бу ошқозон ва ўн икки бармоқли ичакдаги кислота таъсирида шикастланиш, шиллиқ қават очилиш дефекти шиллиқ ости ёки хусусий мушак қаватига тарқалиши билан тавсифланади [1]. Ушбу чуқурликка етиб бормайдиган заарланишлар эрозия деб аталади. Кўшма Штатларда 1990-йилда яра касаллигининг тарқалиши 10% ни ташкил этди ва тахминий касалланиш йилига тахминан 500 000 янги ҳолатни ташкил этади [2, 3]. Умуман олганда, ЯК туфайли ўлим ва касалхонага ётқизиш хавфи бутун дунё бўйлаб камаймокда. Бу, эҳтимоликкиламчи *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) инфекцияси камайиши, унинг яхшиланган даволаш усуллари ва яхшиланган гигиена туфайли [4, 5]. Рецепт бўйича ва рецепсиз кислота бостирувчи воситалардан тез-тез фойдаланиш ва ностероид яллиғланишга қарши дорилар (НЯҚВ) билан эҳтиёткорликни ошириш бу тенденцияни қисман тушунтириши мумкин [5, 6].

ЯК ривожланишининг асосий хавф омиллари *H. pylori* ва ностероид яллиғланишга қарши воситалардан фойдаланиш ҳисобланади, аммо *H. pylori* билан касалланган ёки ностероид яллиғланишга қарши воситалар қабул қилган барча одамларда ЯК ривожланмайди [1, 7]. Дунё аҳолисининг деярли ярмида *H. pylori* колонияси мавжуд [8].

Касалланиш учун хавф омилларига паст ижтимоий-иқтисодий ҳолат ва антисанитария шароитлари ёки ҳаддан ташқари зич яшаш киради. *H. pylori* тарқалиши ривожланаётган мамлакатларда юқори ва айрим этник гуруҳларда кўпроқ учрайди. Сўнгги беш йил ичida қўшма Штатлардаги барча ёш гуруҳларида *H. pylori* тарқалиши пасайиш тенденциясига эга. Бироқ, этник келиб чиқишига асосланган фарқлар мавжуд, инфекция даражаси мексикалик американклар орасида 60% дан ортиқ, испан бўлмаган оқ танлилар орасида эса 30% [9].

H. pylori шиллиқ қаватдаги нейтрофиллар, лимфоцитлар, плазма хужайралари ва макрофаглар билан яллиғланиш реакциясини келтириб чиқаради ва эпителиал хужайраларининг дегенерацияси ва шикастланишига олиб келади. Гастрит одатдаантрум соҳада кўпроқ намоёнбўлади, ошқозон танасида енгилляллиғланиш мавжуд бўлади. Ошқозон яраси бўлган барча беморлар *H. pylori* инфекциясини текширишлари керак. Барча ноинвазив усуллардан

¹ Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали, Самарқанд, Ўзбекистон

² Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд, Ўзбекистон



мочевина тести ва нажасда антигенни аниқлаш тестлари серологик тестларга қараганда энг мақбул ва аниқроқ ҳисобланади [10]. Эндоскопия инвазив бўлсада, биопсияга имкон беради ва гистология, култураникшириш ёки тез уреаза тести каби турли хил синов усууларини ўз ичигаолади. Серологик усуулардан ташқари барча усууларга протон насос ингибиторлари каби кислотани бостирувчи дорилар таъсири қиласири ва улар нотўғри манфий натижалар бериши мумкин.

НЯҚВ лароғриқ ва яллиғланишни камайтириш учун турли хил шароитларда кенг қўлланилади, аммо кўплаб беморларда ошқозон-ичак трактида қўшимча таъсири ривожланади. НЯҚВ ларбарча яраларнинг 90% дан ортиғи учун сабабчирик ва НЯҚВ ларни қабул қилган беморларнинг тахминан 25% да яра касаллиги ривожланади [11]. Аспирин ишлатадиган беморларда пептик яра ривожланиши эҳтимоли икки баравар кўп [12]. Бошқаларида ишлар қаватнинг қон кетиши ва эрозияси деб ҳисобланадиганва адабиётда НЯҚВ-гастропатия деб аталадиган ўртача даражадаги маҳаллий заарланишлар ривожланади. Ушбу кўплаб кичик эрозиялар одатда антрумда жойлашган, аммо ошқозон танасида ҳам пайдо бўлиши мумкин.

НЯҚВ лар бир нечта механизмлар орқали шиллик қаватга зарап етказади. Кўпчилик НЯҚВ лар кучсиз кислоталардир ва протонланган бўлиб, кислотали меъда шираси ($\text{pH}2$) таъсирида эпителий ҳужайраларига кириш учун липид мемраналарини кесиб ўтади. Эпителийхужайрасида ($\text{pH}7.4$) НЯҚВ лар H^+ протонини ионлаштиради ва чиқаради ва липид мемранасини кесиб ўтолмайди ва шубилан тузокқа тушади. Бу оксидловчи фосфорилланишнинг ажралишига олиб келади, бу эса митохондрияда энергия ишлаб чиқаришнинг пасайишига, ҳужайра яхлитлигини пасайишига ва ҳужайра ўтказувчанигини ошишига олиб келади. Бу маҳаллий заарланишга ваэ пителий ҳужайраларининг тез ўлимига, юзаки қон қуилишига ва эрозияга олиб келиши мумкин [14].

НЯҚВ ларнинг шиллик қаватнинг шикастланишига олиб келадиган яна бир асосий механизми бу простогландин синтези учун масъул бўлган циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1) ни ингибирилашидир. Простагландинлар шиллик қаватда бикарбонат секрециясини оширади, шиллик қаватда қон оқимини оширади вашиллиқ тўсиқни сақлаб қолиш учун ҳужайра пролиферациясини пасайириди [5]. Аспирин циклооксигеназани ацетиллайди ва ферментни қайтмас даражада ингибириллайди, НЯҚВ лар эса концентрациясига қараб ферментни қайтар даражада ингибирилаширади. Ушбу патофизиологик реакциялар орасида қон оқимининг пасайиши НЯҚВ лар томонидан етказиладиган зарап учун сабабчи бўлган асосий механизмдир [13].

ЦОГ нинг иккита изоформаси мавжуд: ЦОГ-1 асосан ошқозон-ичак трактида простогландин синтези учун, ЦОГ-2 эса яллиғланиш жойларида простогландин синтези учун жавобгардир. Ибупрофен, напроксен, аспирин ва индометацин каби НЯҚВ лар ЦОГ-1 ва ЦОГ-2 ни бир хил ингибириллайди ва носелектив деб таснифланади. ЦОГ-2-целококсиб ёки рофеококсиб каби ўзига хос НЯҚВ лар ЦОГ-2 ни ўзини ЦОГ-1 га таъсири қилмасдан ингибириллайди ва уларни ошқозон-ичак трактида хавфсизроқ қиласири. ЦОГ-2 ингибиторларини қабул қилган беморларнинг эндоскопик тадқиқотлари 3-5% га анъанавий НЯҚВ ларга нисбатан тахминан 20-40% га ошқозон яраси камлигини кўрсатди. Бироқ, селектив ЦОГ-2 НЯҚВ лари юрак хасталиги хавфини ошириши исботланган ва уларнинг аксарияти савдодан олиб ташланган.

НЯҚВ сабаб бўлган ошқозон яраси ривожланиш хавфиюқори бўлганлар-бу ошқозон яраси касаллиги ёки конкретиши биланоғриган беморлар, бир вақтнинг ўзида стероидлар ёки антикоагулянтлардан фойдаланадиганлар, 65 ўшдан ошганлар ва юқори дозаларда ёки бир нечта НЯҚВ лар комбинациялари қабул қиладиганлар (шу жумладан паст дозали аспирин). Агар ушбу беморларга бир нечта дори-дармонлар керак бўлса, улар ошқозон яраси пайдо бўлишининг олдини олиш учун даволанишдан бошлишлари керак. Бундан ташқари, селектив серотонинни қайтариб олиш ингибиторлари, кортикостероидлар, алдостерон антагонистлари ёки антикоагулянтлар каби дориларни қўллашқон кетиш хавфини оширади [16]. Кекса ёш ва кўплаб қўшимча касалликлар мавжудлиги Н. pylori ва НЯҚВ лар билан оғриган беморларнинг клиник курсига ҳам таъсири қиласири [15, 17]. Н. pylori ва НЯҚВ лар ўртасидаги ўзаро таъсирилар мунозарали, аммо амалдаги кўрсатмалар, агар одам узоқ муддатли НЯҚВ лардан



фойдаланишни бошламоқчи бўлса, *H. pylori* синамасини ва даволашни тавсия қиласи ва узоқ муддатли паст дозали аспиринни қабул қиласиданларда хам синамани ўтказишни кўриб чиқиш мумкин [5, 18].

ЯК ҳолатларининг тахминан бешдан биркисми *H. pylori*, НЯҚВ лар ёки аспирин билан боғлиқ емас, аммо бу қийматнинг аниқлиги – ёлғон манфий *H. pylori* тести ёки тасодифий (ёқикам баҳоланган) НЯҚВ лардан фойдаланиш туфайли шубха остига олинган [19, 20]. Бу идиопатик ЯКшиллиқ қаватнинг яхлитлигига ҳисса қўшадиган омиллар ўртасида номутаносибликни келтириб чиқариб, гиперсекретор ҳолатга олиб келиши мумкин. ЯК нинг бошқа этиологияларига стрессли яралар, ишемия, дорилар (стеноидлар, алэндронат, калий хлорид ва кимётерапевтик воситалар), вируслинфекциялар (CMV, HSV), метаболик касалликлар, нур терапияси, гистамин, эозинофил инфильтрацияси ва базофилия кабилар киради [5, 21].

Меъда-ичак тракти (МИТ) юқори қисмидан ўткир қон кетиш муҳим клиник муаммо бўлиб қолмоқда. Англияда новарикоз ўткир юқори гастродуоденал қонаш частотаси тахминан ҳисобланганда 100 000 бошига 85 нафарни ташкил қиласи йилига [1]. Ўткир варикоз томирларидан қон кетиш билан боғлиқ ўзига хос ўлим даражаси юқори бўлса-да [2], ярали қон кетиш (ЯҚҚ) умумий ўткир ошқозон-ичак қон кетишининг энг кенг тарқалган сабаби бўлиб қолмоқдавақон қўйишни талаб қиласидан сезиларли қон кетиш ҳисобланади [2, 3]. Уни даволашнинг кўп жиҳатларидағи сезиларли ютуқларга қарамай, ошқозон-ичак трактидан ўткир қон кетишининг умумий сабаби ҳали ҳам жуда юқори ва ўлим сезиларли бўлиб қолмоқда (тахминан 10%) ва беморларнинг ёши ва коморбидлиги терапевтик муваффақиятни бироз оқлайди.

Юқори гастродуоденал қонаш хавфини табақалаш учун ишлатиладиган кўплаб тизимлар мавжуд. Эҳтимол, энг кўп ишлатиладиган ва ўрганилган иккитаси Рокалл баллари (эндоскопиядан олдин ҳам, кейин ҳам) ва Глазго - Блатчфорд шкаласи (ШГБ) [12]. Гарчи улар ҳар доим бир оз бошқача жиҳатларни баҳолаш учун ишлаб чиқилган бўлса-да, ушбу тадқиқотларнинг клиник фойдалиларини таққослайдиган доимий тадқиқотлар мавжуд. Шуни ёдда тутиш керакки, ШГБ баллари ўлим хавфини баҳолайди, лекин ҳеч қачон тўғридан-тўғри қарор қабул қилиш воситаси сифатида мўлжалланмаган (беморнинг хавфини баҳолаш билвосита клиник қарорларни қабул қилишга таъсир қилишини ҳисобга олган ҳолда). Шундай қилиб, Рокалл шкаласи паст хавфли ҳолатларни аниқлашда доимий равишда самаралироқ бўлиши ажабланарли эмас [13, 14]. Бундан ташқари, яқинда ўтказилган ҳалқаро текширув Рокалл шкаласи бўйича 0 ёки 1 балл аралашув хавфи жуда пастлиги ва касалхонага ётқизиш ва шошилинч эндоскопия талаб қилинмаслигини тасдиқлади [15].

АИМС65 баллари янада соддароқ усул сифатида тавсия этилган бўлиб, 5 баллни талаб қиласи, қўйидаги омилларнинг ҳар бири учун 1 баллдан атиги: альбумин 30 г/л дан кам, ҳалқаро нормаллаштирилган нисбат ($> 1,5$), Глазгокома баллари 14 дан кам, систоликқонбосими 90 мм.сим.дан камва ёш 65 дан катта. АИМС65 ўлимни ишончли башорат қилиши мумкин бўлса-да, қон қўйиш ёки интенсив терапия бўлимига қабул қилиш каби аралашувларга эҳтиёжни аниқлашда Рокалл шкаласидан камроқ аниқлик кўрсатади [15, 16,].

Яна бир баҳолаш Progetto Nazionale Emorragia Digestiva (PNED), баҳолаш тизими бўлиб, у ёш, саратон мавжудлиги, буйрак етишмовчилиги, Америка анестезиологлар жамияти баҳолашини, жигар циррози, тақрорий қон кетиш ва эндоскопик терапия самарасизлигидан фойдаланган ҳолда жуда мураккаб комплекс баҳолашга асосланган.

Ўткир юқори ГД қон кетишида фавқулодда эндоскопия вақти мунозарали бўлиб қолмоқда, гарчи тўғридан-тўғри эндоскопия (иложи борича эрта) назарий жиҳатдан жозибали кўринади ва далиллар билан тасдиқланмаган. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, жуда эрта эндоскопия яхши натижалар келтирмайди ва баъзи ҳолларда ёмон натижалар келтириб чиқаради (гарчи бу кузатув тадқиқотлари дизайнининг артефакти бўлиши мумкин бўлса ҳам) [18, 19]. Яқинда Роккола шкаласидан фойдаланган беморларда (янакузатувтадқиқотида) ўлим даражаси паст бўлганлиги кўрсатилди [20]. Бу шуни кўрсатадики, Роккола шкаласикасалхонага



ётқизишига муҳтож бўлмаган беморларни саралаш учун ҳам, нисбатан эрта эндоскопиядан фойда кўриши мумкин бўлганларни аниқлаш учун ҳам ишлатилиши мумкин.

Бундан ташқари, энг субъектив мезонлардан ташқари ва фақатгемодинамика ва лаборатория параметрларига таяниб, сурункали касалликлар / асосий коморбид, мелена ва коллапс учун баллар бундан мустасно, кейинги модификациялар ҳақида хабар берилди. Қизиғи шундаки, қисқартирилган балл клиник аралашув зарурлигини тахмин қилишда ҳам яхши ишлади [21]. Қўшимчатадкиқотлар зарур бўлса-да, бу клиник амалиётда фойдали ўзгариш бўлиши мумкин.

Маълумки, кекса bemорларда қон кетадиган гастродуоденал яраларни жарроҳлик йўли билан даволаш кўпинча сезиларли қийинчиликлар билан кечади. Ушбу тоифадаги bemорларда шошилинч жарроҳлик аралашувлардан кўра кечикирилган ва режалаштирилган операциялар афзалроқдир. Кекса bemорларда ноқулай даволаниш натижаларига олиб келадиган энг кўп учрайдиган сабаблар орасида касалхонадаги жарроҳлик аралашуви (bemорларнинг умумий сонининг 20,4%), жарроҳларнинг тактик ва техник хатолари (11,8%) [25]. Эндоскопик гемостаздан кейин гастродуоденал қон кетишининг тақрорланишини башорат қилиш катта аҳамиятга эга ва фаол жарроҳлик тактикаси ҳозирда тақрорланиш эҳтимоли юкори бўлган ҳолларда танлов стратегияси ҳисобланади [15]. Жарроҳлик усулини танлаш кўплаб омилларга боғлиқ, аммо асосийларидан бири ярали ўзгаришнинг жойлашувиdir. Ошқозон ярасининг қон кетиши учун ошқозонни резекция қилиш етарли аралашув ҳисобланади. Қон кетаётган ўн икки бармоқли ичак яраси (шунингдек, Пре-ва пилорик ошқозон яраси) учун энг тўғри аралашув-бу яранинг ўзида гемостатик жарроҳлик магистрал ваготомияси ва ошқозон дренаж аралашуви билан биргаликда [14]. Шуни таъкидлаш керакки, ярали ГДҚК учун жарроҳлик амалиётини ўтказишида агрессив ёндашув тавсия этилади, чунки тақрорий қон кетиш чекланган аралашувлардан кейин тез-тез содир бўлади ва ўлимга олиб келиши мумкин [24]. Шу билан бирга, А. Черноусова ва Т. Т. Штабинская (2020) маълумотларига кўра, гастродуоденал мураккаб bemорларни жарроҳлик даволаш натижаларияралар кўп жиҳатдан бажарилган операция ҳажмига боғлиқ. Етарли жарроҳлик аралашувни танлашга обьектив ёндашувни таъминлаш учун муаллифлар bemорларнинг аҳволи оғирлигини индексли баҳолаш шкаласини ишлаб чиқдилар. Бунга қараб, ярали қон кетиш бўйича операциялар ҳажми одатдаги ошқозон резекциясидан ёки ўн икки бармоқли ичак ярасини ваготомия ва пилоропластика билан олиб ташлашдан меъданни понасимон резекциясигача, энг оғир ҳолатларда эса-ошқозон ярасини кесиш ёки оддий тикиш билан ўзгарган. Ушбу ёндашув натижасида операциядан кейинги ўлим 8,7% дан 5,4% гача камайди [26].

Адабиётлар.

1. Актуальные проблемы хирургического лечения постгастрорезекционных синдромов / А. Черноусов, Т. Хоробрых, М. Зубарева [и др.] // Врач. - 2019. - № 6. - С. 3-9.
2. Особенности экспрессии рецепторов мелатонина второго типа эпителиоцитами пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / О.А. Карпович, Т.Т. Штабинская, В.И. Шишко, Я.А. Колодзейский // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. -2020. - Т. 30, № 2. - С. 26-34.
3. Прободная язва: клинические рекомендации / Российское общество хирургов. - 2020. - URL: <http://xn—9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn--p1ai/stranica-pravlenij-a/klinicheskie-rekomendaci/urgentnaj-a-abdominalnaj-a-hirurgij-a/probodnaj-a-j-azva-versij-a-oktj-abr-2020-goda.html>.
4. Рахмонов, Ф. С., & Шоназаров, И. Ш. (2024). Новые методы эндоскопическая диагностика неуточненных желудочно-кишечных кровотечений. *Sustainability of education, socio-economic science theory*, 2(14), 175-177.



5. Рахмонов, Ф. С., & Шоназаров, И. Ш. (2024). Оценка эффективный влияния ремаксола на систему гемостаза при остром желудочно-кишечном кровотечении. *Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences*, 2(25), 233-237.
6. Рузиев, П. Н., Мизамов, Ф. О., Шоназаров, И. Ш., & Холмирзаев, О. М. (2018). Результаты лечения тромбоза мезентериальных сосудов. In *Роль больниц скорой помощи и научно исследовательских институтов в снижении предотвратимой смертности среди населения* (pp. 190-191).
7. Состояние экстренной хирургической помощи в Российской Федерации / А.Ш. Ревишвили, А.В. Федоров, В.П. Сажин, В.Е. Оловянный // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2019. - № 3. - С. 88-97.
8. Трефоильные факторы - новые маркеры мукозального барьера желудочно-кишечного тракта / А.В. Шестопалов, А.С. Дворников, О.В. Борисенко, А.В. Тутельян // Инфекция и иммунитет. - 2019. - Т. 9, № 1. - С. 39-46.
9. Тухтаев, Б. Х., Нарзуллаев, С. И., Мизамов, Ф. О., Шоназаров, И. Ш., Кадыров, Р. Н., & Облакулов, З. Т. (2020). Тактика лечения пищеводно-желудочных кровотечений у больных с синдромом портальной гипертензии. *Достижения науки и образования*, (1 (55)), 79-82.
10. Чечулин, Е.С Подходы к лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в историческом аспекте / Е.С. Чечулин. // Международный научно-исследовательский журнал. - 2020. - Т. 91, № 1. -С. 83-86.
11. Шоназаров, И. Ш., & Адизов, Ф. Э. (2024). Новые методы и диагностика лечения острой кишечной непроходимости лапароскопическим путем. *Journal the Coryphaeus of Science*, 6(1), 56-61.
12. Шоназаров, И. Ш., & Ачилов, М. Т. (2023). Новые методы и диагностики лапароскопического лечения кишечной непроходимости. *Research Focus*, 2(11), 148-153.
13. Шоназаров, И. Ш., Камолидинов, С. А., & Ахмедов, Р. Ф. (2021). Хирургическое лечение острой спаечной тонкокишечной непроходимости лапароскопическим методом. *Вопросы науки и образования*, (31 (156)), 69-78.
14. Язвенная болезнь : клинические рекомендации / Д.Н. Андреев, Е.К. Баранская, С.Г. Бурков [и др.]. - Российское общество колоректальных хирургов, 2019. - 37 с.
15. A comparative study of risk of pneumonia and mortalities between nasogastric and jejunostomy feeding routes in surgical critically ill patients with perforated peptic ulcer / S.C. Wu, P. Hsieh, Y.W. Chen [et al.] // PLoS One. - 2019. - Vol. 14, № 7. - P. e0219258. - doi: 10.1371/journal.pone.0219258.
16. A Population-Based Cohort Study Examining the Long-term Risk of Repeated Surgery in Non-Helicobacter pylori-Infected PPU Patients Who Underwent Simple Closure / S.C. Wu, W.T. Chen, C.H. Muo [et al.] // J. Gastrointest Surg. - 2020. -Vol. 24, № 11. - P. 2587-2595. - doi: 10.1007/s11605-019-04442-3
17. Amini, A. Duodenal Perforation / A. Amini, R.A. Lopez // StatPearls. - Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2020. - URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553084/>.
18. Are Patients with Perforated Peptic Ulcers Who are Negative for Helicobacter pylori at a Greater Risk? / R.K. Rasane, C.B. Horn, A.A. Coleoglou Centeno [et al.] // Surg. Infect. (Larchmt). - 2019. - Vol. 20, № 6. - P. 444-448. -doi: 10.1089/sur.2018.249.
19. Assessment of PULP score in predicting 30-day perforated duodenal ulcer morbidity, and comparison of its performance with Boey and ASA, a retrospective study / T. Saafan, W. El Ansari, O. Al-Yahri [et al.] // Ann. Med. Surg. (Lond). -2019. - Vol. 42. - P. 23-28. - doi: 10.1016/j.amsu.2019.05.001.



20. Beek, M.A. Maagperforatie bij Oost-Europese arbeidsmigranten [Gastric perforation in Eastern European economic migrants] / M.A. Beek, A.G.L. Bodelier, R.M.P.H. Crolla // Ned. Tijdschr. Geneesk. - 2019. - Vol. 163. - P. D3518.
21. Co-administering Melatonin With an Estradiol-Progesterone Menopausal Hormone Therapy Represses Mammary Cancer Development in a Mouse Model of HER2-Positive Breast Cancer / B.R. Dodd, C.D. Bondi, M. Hasan [et al.] // Front Oncol. - 2019. - Vol. 9. - P. 525.
22. Cui, N. Comparison of laparoscopic surgery versus traditional laparotomy for the treatment of emergency patients / N. Cui, J. Liu, H. Tan // J. Int. Med. Res. - 2020.
23. Decline in acute upper gastrointestinal bleeding during COVID-19 pandemic after initiation of lockdown in Austria / A. Schmiderer, H. Schwaighofer, L. Niederreiter [et al.] // Endoscopy. - 2020. - Vol. 52, № 11. - P. 1036-1038. -doi: 10.1055/a-1178-4656.
24. Diagnosis and management of duodenal perforations: a narrative review / D. Ansari, W. Toren, S. Lindberg [et al.] // Scand J. Gastroenterol. - 2019. -Vol. 54, № 8. - P. 939-944. - doi: 10.1080/00365521.2019.1647456.
25. Doomra, R. NSAIDs and self-medication: A serious concern / R. Doomra, A. Goyal // J. Family Med. Prim. Care. - 2020. - Vol. 9, № 5. - P. 2183-2185. -doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_201_20.
26. Endoscopic Ultrasound-Guided Treatments for Non-Variceal Upper GI Bleeding: A Review of the Literature / C.G. De Angelis, P. Cortegoso Valdivia, S. Rizza [et al.] // J. Clin. Med. - 2020. - Vol. 9, № 3. - P. 866. - doi: 10.3390/jcm9030866.
27. Evidence-based clinical practice guidelines for peptic ulcer disease 2020 / T. Kamada, K. Satoh, T. Itoh [et al.] // J. Gastroenterol. - 2021. - Vol. 54. -P. 303-322. - doi: 10.1007/s00535-021-01769-0.
28. Extracellular matrix dynamics in cell migration, invasion and tissue morphogenesis / K.M. Yamada, J.W. Collins, D.A. Cruz Walma [et al.] // Int. J. Exp. Pathol. -2019. - Vol. 100, № 3. - P. 144-152. - doi: 10.1111/iep.12329.
29. Fungal Isolates in Peritoneal Fluid Culture Do Not Impact Peri-Operative Outcomes of Peptic Ulcer Perforation / J.R. Kwan, M. Lim, F. Ng, V. Shelat // Surg. Infect. (Larchmt). - 2019. - Vol. 20, № 8. - P. 619-624. - doi: 10.1089/sur.2019.024.
30. Genetic polymorphisms associated with upper gastrointestinal bleeding: a systematic review / M. Forgerini, R.C. Lucchetta, G. Urbano [et al.] // Pharmacogenomics J. - 2021. - Vol. 21, № 1. - P. 20-36. - doi: 10.1038/s41397-020-00185-6.
31. Guidelines for Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleeding / J.S. Kim, B.W. Kim, D.H. Kim [et al.] // Gut. Liver. - 2020. - Vol. 14, № 5. - P. 560-570. -doi: 10.5009/gnl20154.
32. Hospitalizations for Peptic Ulcer Disease in China: Current Features and Outcomes / Y. Zheng, M. Xue, Y. Cai [et al.] // J. Gastroenterol. Hepatol. - 2020. - Vol. 35. -P. 2122 -2130. - doi: 10.1111/jgh.15119.
33. Karamitri, A. Melatonin in type 2 diabetes mellitus and obesity / A. Karamitri, R. Jockers // Nat. Rev. Endocrinol. - 2019. - Vol. 15, № 2. - P. 105-125.
34. Laparoscopic repair of perforated peptic ulcer is not prognostic factor for 30-day mortality (a nationwide prospective cohort study) / S. Zogovic, A.B. Bojesen, S. Andos, F.V. Mortensen // Int. J. Surg. - 2019. - Vol. 72. - P. 47-54. -doi: 10.1016/j.ijsu.2019.10.017.

